

PROSPECTO

POTENCIATOR® 5 g Aspartato de Arginina

COMPOSICION

Cada ampolla bebible contiene:

Aspartato de arginina..... 5 g

Sorbitol solución al 70 %..... 2 g

Otros excipientes:

Sacarosa, ácido cítrico monohidrato, sacarina sódica, esencia de frambuesa, sorbato de potasio (E202), agua desionizada, nipagín M (E218), nipasol M (E216), c.s.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Solución oral en ampollas bebibles. Envase con 20 ampollas.

ACTIVIDAD

Los componentes de POTENCIATOR son dos aminoácidos que participan en el restablecimiento de las reservas protéicas.

TITULAR

IQUINOSA

C/ Alpedrete, 24

28045 Madrid

FABRICANTE

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FAES

c/ Máximo Aguirre, 14

Lamiaco-Lejona (Vizcaya)

INDICACIONES

Prevención de estados carenciales de aminoácidos por ingestión insuficiente de proteínas debido a regímenes vegetarianos, falta de apetito, convalecencias.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave.

PRECAUCIONES

Las personas con problemas de retención urinaria, sólo lo tomarán bajo control médico.

No tomar de forma continuada. En caso de agravamiento o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia.

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Las mujeres en período de lactancia no deben utilizar este medicamento sin consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

Advertencia sobre excipientes

Este medicamento contiene 1'4 g de sorbitol por ampolla bebible. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Por contener sorbato de potasio como excipiente es perjudicial para pacientes con dietas pobres en potasio. El exceso de potasio puede producir, después de la administración oral, molestias de estómago y diarrea.

POSOLOGIA

Vía Oral:

Adultos : la dosis usual de POTENCIATOR 5 g es de 1 a 2 ampollas bebibles al día.

Niños : la dosis recomendada es de 1 ampolla al día.

Se pueden tomar diluidas en un poco de agua o zumo de frutas al final de las comidas principales.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PREPARADO

“Dibujos ilustrativos de la forma de administración del Medicamento”

1. Separar la ampolla.
2. Rasgar la lengüeta de la parte superior con un movimiento giratorio.
3. Después invertirla, apretar la ampolla y verter el contenido en un vaso.

SOBREDOSIS

La ingestión continuada o accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos). Consultar al médico.

En cualquier caso:

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

En algunos casos reacciones alérgicas. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Sin receta médica

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños