



Resorborina®

Solución bucofaríngea

Antiinfeccioso buco-faríngeo

PROPIEDADES

Las afecciones inflamatorias de la región buco-faríngea requieren las siguientes acciones terapéuticas: antiséptica, analgésica, antiflogística y astringente. El desarrollo de estas acciones, a través de sus componentes, caracteriza a RESORBORINA solución como el preparado adecuado para ser utilizado en la curación de la mayor parte de los procesos inflamatorios e infecciosos tan frecuentes en esta zona anatómica.

COMPOSICIÓN

	Por 100
ml	
Benzalconio cloruro (D.O.E.).....	100
mg	
Tetracaína (D.O.E.) clorhidrato.....	20
mg	
Dexametasona (D.O.E.)	5
mg	
Resorcinol (D.O.E.).....	2 g
Excipientes: Alcohol 96° (22,5 % v/v), glicerol, jarabe simple, esencia soluble de menta piperita y agua purificada	
	.c.s.

TITULAR

Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.

FABRICANTE

LABORATORIOS ERN, S.A. Polígono Industrial Can Salvatella. Calle Gorcs i Lladó, 188 08210 Barberá del Vallés, España

O

LABORATORIOS ERN, S.A. Peru, 228. 08020 Barcelona, España

INDICACIONES

Faringitis. Estomatitis. Llagas de boca y lengua. Gingivitis. Piorrea. Anginas de distinta etiología. Infecciones crónicas de garganta. Infecciones crónicas del tejido linfóide faríngeo.

POSOLOGIA

Gargarismos: Diluir una cucharadita del preparado en dos cucharadas de agua.

Pulverizaciones: Aplicar sola o diluida con agua templada, mediante un pulverizador apropiado.

En ambos casos, administrar de 3 a 6 veces diarias, según prescripción médica.

ADVERTENCIA

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

"ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES": Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de piel.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad a componentes.



EFFECTOS SECUNDARIOS

Raramente reacciones alérgicas.

El paciente debe comunicar a su médico o farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviere descrita.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

No se ha descrito. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 y 200 ml de solución.

Antes de su administración, compruebe que la fecha de caducidad de los envases no ha sido sobrepasada.

Sin receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

“Logotipo”

Laboratorios ERN, S.A.

Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.