



## AERO-RED® GOTAS ORALES

SIMETICONA

### COMPOSICIÓN:

Para 1 ml (20 gotas) Simeticona 100 mg; Sacarosa; Etanol 0,1 g y otros excipientes: Alcohol polivinílico, Aerosil, P-hidroxibenzoato de metilo, P-hidroxibenzoato de propilo, Esencia de fresa, Colorante rojo (E 123) y agua destilada.

### FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

Envases de 25 ml y 100 ml de gotas orales en solución.

### ACTIVIDAD:

AERO-RED es una silicona antiespumante, que destruye las burbujas de gas, facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasiona.

### TITULAR:

URIACH-AQUILEA OTC S.L., Av. Camí Reial 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

### RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN:

ITALFARMACO, S.A., C/ San Rafael 3 Polígono Industrial Alcobendas, 28108 Alcobendas (Madrid)

### INDICACIONES:

Alivio sintomático de los gases (Aerofagia y meteorismo), con todas sus manifestaciones. Facilita el eructo.

### CONTRAINDICACIONES:

Alergia a la dimeticona o simeticona.

### PRECAUCIONES:

En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.  
No exceder la dosis recomendada.

### INTERACCIONES:

No se han descrito.

### ADVERTENCIAS:

Este medicamento contiene 10% v/v de etanol en volumen final. Cada ml contiene 0,1 g de etanol lo que puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos.

Este medicamento contiene colorante rojo (E123) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico.

### Embarazo y lactancia:

IMPORTANTE PARA LA MUJER:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Uso en niños:**

Consultar al médico.

**Efectos sobre la capacidad de conducción:**

No se han descrito.


**POSOLOGIA:**

Lactantes y niños, siempre bajo consejo médico: 10 gotas en el biberón o con otro alimento o líquido, puede administrarse tres o cuatro veces al día.

Adultos: tome 20 gotas tres o cuatro veces al día.

AERO-RED gotas tiene sabor a fresa y puede administrarse solo o diluido en cualquier líquido.

Agítese antes de usarlo.



Para su utilización, córtese la punta del dosificador.

**SOBREDOSIFICACION Y SU TRATAMIENTO:**

Aunque no es de esperar fenómenos de intoxicación, en caso de ingestión accidental consulte a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono: 91 562 04 20

**REACCIONES ADVERSAS:**

Eructos. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

**CADUCIDAD:**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**CONSERVACION:**

No guardar en el cuarto de baño o en los lugares de elevada humedad.

**TEXTO REVISADO:** Octubre 1994

**SIN RECETA MEDICA**



LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**URIACH AQUILEA OTC**  
Av. Camí Reial, 51-57  
08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

---