

**Becozyme® C forte comprimidos recubiertos**  
**Complejo de vitaminas hidrosolubles. 7 vitaminas B y vitamina C**

**COMPOSICIÓN**

Cada comprimido recubierto contiene:

Tiamina (DCI) (Vit. B <sub>1</sub> )	15,00 mg
Riboflavina (DCI) (Vit. B <sub>2</sub> )	15,00 mg
Nicotinamida (DCI) (Vit. PP)	50,00 mg
Piridoxina (DCI) (Vit. B <sub>6</sub> )	10,00 mg
Pantotenato de calcio (DCI)	25,00 mg
Biotina (DCI) (Vit. H)	150,00 mcg
Cianocobalamina (DCI) (Vit. B <sub>12</sub> )	10,00 mcg
Acido ascórbico (DCI) (Vit. C)	200,00 mg

Sacarosa, óxido de magnesio, lactosa, talco, estearato de magnesio, kollidon K90, kollidon K30, D-manita, etilcelulosa, almidón de maíz, goma arábica, óxido de titanio (dióxido), parafina sólida, aceite de parafina interno fluido, cantaxantina 100 en forma de cantaxantina al 10% tipo ROR.

**FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE**

Envase con 30 comprimidos recubiertos.

**ACTIVIDAD**

Vitaminas del Complejo B y vitamina C.

**TITULAR**

QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.A.  
Pau Claris, 196  
08037 BARCELONA

**FABRICANTE**

ROCHE, S.p.A.  
Via Morelli, 2  
20090 SEGRATE, Milán (Italia)

**INDICACIONES**

Prevención de estados carenciales de vitaminas del grupo B y vitamina C cuando no se produzca un aporte adecuado de estas vitaminas, como en períodos de inapetencia, convalecencia o regímenes alimenticios.

**CONTRAINDICACIONES**

Alergia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal grave. Enfermedad de Leber.

En condiciones normales no deben administrarse en el embarazo dosis superiores a 100 mg de vitamina C al día y, en cualquier caso, siempre por indicación del médico. Aunque no hay evidencia de efectos perjudiciales la seguridad fetal de dosis altas de vitamina C no ha sido establecida.

## **PRECAUCIONES**

No debe tomarse de forma continuada. En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

No deben tomarse dosis altas de vitamina C en el embarazo (VER CONTRAINDICACIONES).

Los pacientes con historia de formación de cálculos o gota deberán consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

## **INTERACCIONES**

Con tratamientos antiparkinsonianos a base de L-Dopa.

La vitamina C en dosis altas puede modificar la acción de ciertos medicamentos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando anticonceptivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas, trimetoprim/sulfametoxazol o anticonceptivos hormonales.

## **ADVERTENCIA**

Posibilidad de resultados erróneos en las pruebas de glucosa en orina, incluso mediante tiras reactivas.

### **- Embarazo y lactancia:**

#### **Importante para la mujer**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

- **Uso en niños:** Consultar al médico.

- **Uso en ancianos:** Ver posología adultos.

- **Efectos sobre la capacidad de conducción:** No tiene.

## **POSOLOGÍA**

Adultos: La dosis normal es de un comprimido recubierto al día, ingerida sin masticar. Vía oral.

## **SOBREDOSIFICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

Por sobredosificación o ingestión accidental de grandes cantidades, se podrían producir alteraciones digestivas (náuseas, vómitos, diarreas), dolor de cabeza o de articulaciones y nerviosismo. Consultar al médico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562 04 20.

## **REACCIONES ADVERSAS**

Posibilidad de reacciones alérgicas a alguno de sus componentes.

Las dosis de ácido ascórbico superiores a 1 g por día pueden producir diarrea, cálculos renales y calambres abdominales. Así mismo existe el riesgo de formación de cálculos y de precipitar ataques agudos de gota en individuos predispuestos.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

## **CADUCIDAD**

Este medicamento no debe utilizarse después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

## **CONSERVACIÓN**

Protéjase el envase del calor.

## **TEXTO REVISADO**

Junio 1994

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**