

## **ISOPTO B<sub>12</sub>** (Cianocobalamina)

La fragilidad del epitelio corneal suele ser causa de gran número de lesiones corneales de muy diversa etiología. Aun cuando su fisiología pueda ser alterada por diversos motivos, ya sean locales (blefaritis, conjuntivitis, etcétera), o bien por alteraciones metabólicas generales (avitaminosis, trastornos hepáticos, etcétera), la fragilidad corneal se pone muy especialmente de manifiesto en la aplicación de lentillas corneales, en cuyo caso se producen microerosiones y pérdidas de sustancias corneales, que llegan a imposibilitar el uso de las mismas.

La cianocobalamina, o vitamina B<sub>12</sub>, administrada localmente en forma de colirio, desarrolla una acción neurotrófica sobre los plexos nerviosos del tejido corneal, favoreciendo la normal regeneración e integridad de las células epiteliales.

Gracias a esta acción se logra prevenir la fragilidad del epitelio corneal y la aparición de sus secuelas y complicaciones.

### **COMPOSICIÓN**

**Cada ml contiene:** cianocobalamina (DCI) (Vit.B<sub>12</sub>) 0,5 mg, tiomersal (conservante) 0,1 mg y cloruro sódico, hidroxipropilmetilcelulosa, fosfato disódico, fosfato monosódico y agua purificada c.s.

### **INDICACIONES**

Fragilidad del epitelio corneal. Ulceraciones recidivantes de córnea. Erosiones y heridas corneales. Procesos de reepitelización corneal. Tratamientos post-quirúrgicos. Quemaduras de origen químico o físico. Extracción de cuerpos extraños intraoculares.

### **DOSIFICACIÓN**

Como término medio se instilarán 2 gotas en cada ojo de 3 a 6 veces al día.

### **CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS**

El ISOPTO B<sub>12</sub> no posee contraindicaciones ni efectos secundarios. (Ver también Advertencia sobre excipientes).

### **INCOMPATIBILIDADES**

Puede administrarse simultáneamente con cualquier otra medicación, ya sea local o general.

### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

El ISOPTO B<sub>12</sub>, administrado en la forma indicada, no puede producir intoxicaciones. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

**CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

Mantener el envase bien cerrado.

No tocar el gotero con el fin de no contaminar la solución.

**PRESENTACIÓN**

Envase cuentagotas de 5 ml.

**ADVERTENCIAS****Advertencia sobre excipientes:**

Este medicamento, por contener tiomersal como excipiente puede causar daño renal.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

SIN RECETA MEDICA

ALCON CUSÍ, S.A.  
c/ Camil Fabra, 58  
08320 El Masnou - Barcelona