



Dismegyn[®] cápsulas

Extracto seco de frutos de *Vitex agnus-castus* L. (Sauzgatillo)

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse adecuadamente.

- *Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo*
- *Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.*
- *Si los síntomas empeoran o persisten después de 8 semanas, debe consultar a su médico.*
- *Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.*

Contenido del prospecto:

1. Qué es **Dismegyn[®]** y para que se utiliza
2. Antes de tomar **Dismegyn[®]**
3. Cómo tomar **Dismegyn[®]**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Dismegyn[®]**
6. Información adicional

1. QUE ES Dismegyn[®] Y PARA QUE SE UTILIZA:

Son cápsulas duras. Cada estuche de cartón contiene 30 cápsulas. Este medicamento es un preparado ginecológico.

Dismegyn[®] alivia la hinchazón y tensión dolorosa mamaria del síndrome premenstrual y la irritabilidad derivada de estos síntomas.

2. ANTES DE TOMAR Dismegyn[®]:

No tome Dismegyn[®] en los siguientes casos:

- Si es alérgico (hipersensible) al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de **Dismegyn[®]**.
- No se puede tomar **Dismegyn[®]** en caso de tumores de la hipófisis (glándula pituitaria) y en cáncer de mama.

Tenga especial cuidado con Dismegyn[®]:

- Si los síntomas continúan o empeoran después de 8 semanas de tratamiento a pesar de dosificación suficiente e ingestión regular, se debe consultar al médico.

Uso de otros medicamentos:

- Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.
 - Los efectos de **Dismegyn**[®] pueden resultar alterados debido a la toma conjunta con algunos medicamentos.
 - Hay evidencia de que puede haber un debilitamiento mutuo de la eficacia si se administran simultáneamente **Dismegyn**[®] con antagonistas del receptor de dopamina.
- La acción dopaminérgica del *Vitex agnus-castus* L. podría producir en la acción de los antagonistas dopaminérgicos un efecto atenuante de forma recíproca.

Niños:

- Este medicamento no se administrará a niños.

Embarazo:

- No tome **Dismegyn**[®] durante el embarazo.
- Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y, debe ser vigilado por su médico.

Lactancia:

- No tome **Dismegyn**[®] durante la lactancia. En animales de experimentación, se ha observado una disminución en la producción de leche tras la toma de frutos de *Vitex agnus castus* L..

Conducción y uso de máquinas:

- No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducción y uso de maquinaria.

Información importante sobre algunos de los componentes de **Dismegyn[®]:**

- Este medicamento contiene 36 mg de glucosa y 34 mg de lactosa por cápsula. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. COMO TOMAR **Dismegyn[®]:**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde tomar su medicamento.

Adultos:

- La dosis recomendada es de una cápsula una vez al día.
- **Dismegyn**[®] debe ser tomado por vía oral y a ser posible a la misma hora del día. Se recomienda una duración del tratamiento de tres meses.
- Si usted estima que la acción de **Dismegyn**[®] es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si usted toma más **Dismegyn[®] del que debiera:**

- Hasta ahora no se han observado efectos de sobredosificación. En caso de ingestión accidental de grandes cantidades, acuda a un centro médico o llame al servicio de Información Toxicológica, tel.: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar Dismegyn®:

- No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Al igual que todos los medicamentos, **Dismegyn®** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Ocasionalmente puede causar la aparición de erupciones cutáneas con prurito.

Si observa ésta o cualquier otra reacción adversa no descrita en este prospecto, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE Dismegyn®:

Caducidad

No utilice **Dismegyn®** después de la fecha de caducidad indicada en la caja y cada uno de los blisters.

No conservar a temperatura superior a 30° C. Conservar en el envase original.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger al medio ambiente.

MANTENER **Dismegyn®** FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL:**Composición de Dismegyn®:**

- El principio activo de **Dismegyn®** es *Vitex agnus-castus* L.
Cada cápsula contiene 4 mg de extracto seco de frutos de *Vitex agnus-castus* L. Se ha utilizado como solvente de extracción etanol 60% v/v.
- Los excipientes son: glucosa líquida, sílice coloidal anhidra, lactosa monohidrato, estereato magnésico, almidón de maíz y talco. La cápsula de gelatina está compuesta por gelatina, laurilsulfato sódico y dióxido de titanio (E 171).

Este medicamento se presenta en cápsulas duras, conteniendo cada estuche de cartón 30 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización:

GYNEA LABORATORIOS, S.L.

C.Colom, 5

08184 Palau-solità i Plegamans

Barcelona

Responsable de fabricación:

WIEWELHOVE GmbH

GildestraBe 39

49477 Ibbenbüren

ALEMANIA

Este prospecto ha sido aprobado en Mes 2010

DISMEGYN® es una marca registrada de GYNEA LABORATORIOS



GYNEA LABORATORIOS, S.L.
C./ Colom, 5
08184 Palau-solità i Plegamans. Barcelona