



**Otogen® calmante**  
**Analgésico**  
**y antiséptico otológico**

**Gotas óticas en solución**

**PROPIEDADES**

Asociación de componentes cuya acción analgésica, deshidratante y desinfectante contribuye a la sedación inmediata del dolor agudo de oído que aparece en determinadas afecciones de oído medio y externo.

**COMPOSICIÓN**

	Por
ml	
Tetracaína (D.O.E.) clorhidrato.....	100
mg	
Fenol .....	40
mg	
Mentol .....	40
mg	
Aceite esencial de clavos .....	40
mg	
Benzalconio cloruro (D.O.E.).....	0,3
mg	
Excipiente: Dietilenglicol .....	
c.s.	

**TITULAR**

Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.

**FABRICANTE**

Laboratorios Belmac, S.A. Polígono Malpica c/ C nº 4. 50016 Zaragoza.

**INDICACIONES**

Afecciones de oído medio y externo que presenten acusado dolor y necesidad de antisepsia. Forunculosis de oído externo. Otitis media catarral simple con tímpano íntegro.

**POSOLOGÍA**

Instilar 2-3 gotas en el oído y taponarlo a continuación con un poco de algodón. Salvo diferente prescripción médica, repetir el tratamiento 2-3 veces al día.

**CONTRAINDICACIONES**

Tímpano perforado y otitis media supurada. Dermatitis y eczema del conducto auditivo externo. Puede sospecharse que se ha producido perforación del tímpano si se observa supuración o exudado sanguinolento, en cuyo caso se deberá consultar al médico antes de administrar el preparado.

**PRECAUCIONES**

Para soslayar efectos secundarios que eventualmente pudieran producirse, se recomienda limitar la administración del preparado a los casos en que, permaneciendo íntegro el tímpano, lo agudo del dolor lo exija y no mantener el tratamiento más tiempo que el realmente preciso.

**ADVERTENCIA**

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.



### **INCOMPATIBILIDADES**

No se han descrito.

### **EFECTOS SECUNDARIOS**

En caso de aplicación excesiva en oído perforado puede producirse irritación en el interior del oído medio.

El paciente debe comunicar a su médico o farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita.

### **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

No se ha descrito.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

### **PRESENTACIÓN**

Frasco de 7,5 ml de solución.

**Antes de su administración compruebe que la fecha de caducidad de los envases no ha sido sobrepasada.**

**Sin receta médica.**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**

“Logotipo”

Laboratorios ERN, S.A.

Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.