

SORBENOR®
Aspartato de Arginina

COMPOSICIÓN

Cada ampolla bebible de 5 ml contiene:

Aspartato de arginina 1 g

Excipientes:

Sacarosa..... 1 g

Nipagín, nipasol, esencia de albaricoque y agua desionizada c.s.p ... 5 ml

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Estuche conteniendo 20 ampollas de 5 ml de solución bebible.

ACTIVIDAD

El principio activo de la especialidad **SORBENOR®**, aspartato de arginina, contribuye a la biosíntesis de proteínas.

TITULAR

Laboratorios CASEN-FLEET, S.L.
Utebo (ZARAGOZA)

FABRICANTE

VIATRIS Manufacturing
Burdeos (FRANCIA)

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de los estados de cansancio, fatiga y convalecencia debidos a un insuficiente aporte de proteínas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave.

PRECAUCIONES

Por su contenido en arginina, las personas con retención urinaria sólo lo tomarán bajo vigilancia médica.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Este medicamento contiene 1 g de sacarosa por ampolla, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

Embarazo

IMPORTANTE

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Lactancia

No hay estudios sobre si el medicamento se excreta por la leche materna. En período de lactancia no deberá tomarse el producto sin consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

Uso en niños

Consultar al médico.

POSOLOGIA

Adultos

2 a 4 ampollas bebidas, al día, en tratamientos mantenidos durante varias semanas, salvo prescripción facultativa.

Niños

La dosis debe ser establecida por el médico según la indicación, edad y el peso del niño. Como norma general, de una a dos ampollas diarias bebidas antes de las comidas.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

No es necesario el empleo de sierra, ya que son ampollas auto-rompibles, cuyas puntas se rompen fácilmente al hacer una pequeña tracción.

Coger la ampolla por su cuerpo y con la otra mano abrir una de las puntas. Dar la vuelta a la ampolla, poniéndola sobre el vaso donde se va a tomar y abrir entonces la otra punta. El vaciado se producirá por sí solo al mantener la ampolla en posición vertical.

SOBREDOSIS

Ante posibles signos de intoxicación por sobredosis o ingestión masiva se hará, si procede, lavado gástrico y tratamiento sintomático.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

REACCIONES ADVERSAS

En algunos casos, reacciones alérgicas. Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa atribuible a la toma del medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN

Condiciones normales. Temperatura ambiente.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

TEXTO REVISADO: JUNIO 2002

SIN RECETA MEDICA

LABORATORIOS CASEN-FLEET, S.L.

UTEBO (Zaragoza)