

**Fenistil® gel**  
**Dimetindeno maleato**

**COMPOSICIÓN**

Dimetindeno (DCI) maleato 100 mg.

Excipientes: cloruro de benzalconio, edetato de sodio, Carbopol 974 P, Hidróxido sódico, Propilenglicol, Agua purificada.

**PROPIEDADES**

Muchas pieles responden frente a diferentes agentes externos liberando una sustancia que se denomina histamina, responsable de una reacción alérgica caracterizada por una erupción cutánea (urticaria, etc.) acompañada de picor (prurito).

El picor puede ser producido por alérgenos externos, siendo los más frecuentes: picaduras de insectos y de animales marinos, plantas, jabones, colonias, pinturas y colorantes, algunos tejidos, metales (bisutería). También puede aliviar el picor en quemaduras superficiales.

Fenistil gel, derivado del fenindeno, es un activo antihistamínico, capaz de producir un efecto antipruriginoso (alivia el picor).

Fenistil gel se presenta en forma de hidrogel; muestra una buena penetración cutánea y alivia el picor (prurito) y la irritación, produciendo un cierto efecto refrescante en la piel afectada.

Fenistil gel actúa rápidamente en la piel. Su efecto antihistamínico se inicia en pocos minutos, alcanzando su máximo efecto después de 1 a 4 horas de su aplicación.

**INDICACIONES**

Alivio sintomático del picor (prurito) de la piel producido por plantas o picaduras de insectos y en general de fenómenos alérgicos de contacto acompañados de picor.

**POSOLOGÍA**

Aplicar 2-4 veces al día en una capa fina sobre la piel de la zona afectada.

**CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.  
Dermatitis exudativas inflamadas de la piel.

**PRECAUCIONES**

Evite la exposición al sol de la zona cutánea tratada y el uso prolongado o en áreas extensas de la piel.  
No ingerir.

Evitar poner en contacto con ojos, boca, oído u otras mucosas.

Si los síntomas persisten más de 7 días, o empeoran, suspender el tratamiento y consultar al médico.

**ADVERTENCIAS**

Importante para la mujer: si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Las mismas precauciones deben tomarse durante la lactancia, ya que no existen datos sobre la excreción del dimetindeno en la leche materna después de su aplicación tópica.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Se han observado en algunos casos ligeras reacciones cutáneas de poca duración, como sequedad o sensación de ardor. En casos aislados: reacciones alérgicas.

## **INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20

## **INCOMPATIBILIDADES**

No utilizar junto con otros antihistamínicos tópicos o antipruriginosos tópicos sin consultar al médico.

## **PRESENTACIÓN**

Envase con 30 g.

## **LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### **SIN RECETA MÉDICA**

Fabricado por  
Novartis Consumer Health, S.A. Nyon Suiza

**Novartis Consumer Health, S.A.**  
Gran Vía de les Corts Catalanes, 764  
08013 Barcelona – España

Revisado: julio 1999