



HURRICAINÉ
SPRAY

Benzocaína

COMPOSICIÓN

Por cada 100 ml:

Benzocaína 20 g

Excipientes: Sacarina, Polietilenglicol, Aroma de cereza.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Solución gingival y dental para aerosol de 5 ml

ACTIVIDAD

HURRICAINÉ Spray es una solución anestésica local útil para combatir el dolor cuando se aplica externamente sobre la mucosa oral.

TITULAR

Laboratorios CLARBEN S.A, C/ Asura 111 local 1 y 4, 28043 Madrid

FABRICANTE

SOLVAY PHARMA C/ Ramón y Cajal 2- Parets del Vallés- 08150- Barcelona.

INDICACIONES

Alivio local, temporal y sintomático de las molestias o dolores de muelas, dientes, encías y molestias de la mucosa oral producidas por el roce de prótesis y extracciones dentales, hasta poder ser atendido adecuadamente por el médico especialista.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en casos de alergia a la benzocaína o a otros anestésicos locales o a cualquier otro componente del medicamento.

No utilizar en niños menores de 2 años.

PRECAUCIONES

Aplicar este producto exclusivamente sobre los dientes, muelas, encías o mucosa oral.

En caso de que los síntomas empeoren o persista el dolor durante más de 7 días de tratamiento interrúmpalo y consulte al médico.

No inhalar ni ingerir. Evitar la pulverización sobre los ojos. Evitar aplicar este medicamento sobre la garganta ya que por su efecto anestésico podría dificultar el proceso de deglución (tragar alimentos y líquidos). No masticar alimentos o chicles en la hora siguiente al uso de la medicación o mientras dure el efecto anestésico del medicamento por riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal.

INTERACCIONES

No debe utilizarse a la vez que las sulfamidas ni con inhibidores de la colinesterasa.

Si está utilizando algún medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Interacciones con pruebas de diagnóstico

Antes de la realización de cualquier prueba de diagnóstico comunique a su médico que está utilizando este medicamento.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia

Consultar con el médico antes de utilizar este medicamento.

Uso en niños

Contraindicado en niños menores de 2 años. En niños entre 2 y 6 años las dosis deben reducirse.

La aplicación se realiza siguiendo las instrucciones para la correcta administración del preparado.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria

No se han descrito.

deportistas

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

POSOLOGIA

La aplicación es exclusivamente sobre los dientes, muelas, encías o mucosa oral.

Uso dental y gingival.

No aplicar este medicamento más veces de las recomendadas, ni más de 7 días seguidos.

Adultos y niños mayores de 6 años

Aplicar el producto hasta 4 veces al día siguiendo las instrucciones para la correcta administración del preparado.

En niños entre 2 y 6 años

La dosis debe reducirse.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Exclusiva aplicación sobre dientes, muelas y encías.

Destapar el frasco y colocar el tubo aplicador en la válvula dosificadora. La aplicación podrá efectuarse, bien directamente pulsando medio segundo la válvula y orientando con el tubo aplicador la salida de la solución hacia la zona dolorida, o bien empapando un algodón con varias pulsaciones y manteniéndolo aplicado en la zona por unos momentos.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental acuda a un centro médico o consulte al servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91/5620420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.



REACCIONES ADVERSAS

Puede aparecer sensación de quemazón bucal, o reacciones alérgicas en forma de erupciones en la piel. En estos casos suspenda la utilización del medicamento y acuda al médico. Si se observa ésta o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

OTRAS PRESENTACIONES

HURRICAINÉ SPRAY: Envase con 60 ml

HURRICAINÉ GEL: Envase con 30 ml, 6 ml

TEXTO REVISADO

Marzo 2001

SIN RECETA MEDICA

"Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños"



HURRICAINÉ
SPRAY

Benzocaína

COMPOSICIÓN

Por cada 100 ml:

Benzocaína 20 g

Excipientes: Sacarina, Polietilenglicol, Aroma de cereza.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Solución gingival y dental para aerosol de 60 ml

ACTIVIDAD

HURRICAINÉ Spray es una solución anestésica local útil para combatir el dolor cuando se aplica externamente sobre la mucosa oral.

TITULAR

Laboratorios CLARBEN S.A, C/ Asura 111 local 1 y 4, 28043 Madrid

FABRICANTE

SOLVAY PHARMA C/ Ramón y Cajal 2- Parets del Vallés- 08150- Barcelona.

INDICACIONES

Alivio local, temporal y sintomático de las molestias o dolores de muelas, dientes, encías y molestias de la mucosa oral producidas por el roce de prótesis y extracciones dentales, hasta poder ser atendido adecuadamente por el médico especialista.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en casos de alergia a la benzocaína o a otros anestésicos locales o a cualquier otro componente del medicamento.

No utilizar en niños menores de 2 años.

PRECAUCIONES

Aplicar este producto exclusivamente sobre los dientes, muelas, encías o mucosa oral.

En caso de que los síntomas empeoren o persista el dolor durante más de 7 días de tratamiento interrúmpalo y consulte al médico.

No inhalar ni ingerir. Evitar la pulverización sobre los ojos. Evitar aplicar este medicamento sobre la garganta ya que por su efecto anestésico podría dificultar el proceso de deglución (tragar alimentos y líquidos). No masticar alimentos o chicles en la hora siguiente al uso de la medicación o mientras dure el efecto anestésico del medicamento por riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal.

INTERACCIONES

No debe utilizarse a la vez que las sulfamidas ni con inhibidores de la colinesterasa.

Si está utilizando algún medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Interacciones con pruebas de diagnóstico

Antes de la realización de cualquier prueba de diagnóstico comunique a su médico que está utilizando este medicamento.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia

Consultar con el médico antes de utilizar este medicamento.

Uso en niños

Contraindicado en niños menores de 2 años. En niños entre 2 y 6 años las dosis deben reducirse.

La aplicación se realiza siguiendo las instrucciones para la correcta administración del preparado.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria

No se han descrito.

deportistas

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

POSOLOGIA

La aplicación es exclusivamente sobre los dientes, muelas, encías o mucosa oral.

Uso dental y gingival.

No aplicar este medicamento más veces de las recomendadas, ni más de 7 días seguidos.

Adultos y niños mayores de 6 años

Aplicar el producto hasta 4 veces al día siguiendo las instrucciones para la correcta administración del preparado.

En niños entre 2 y 6 años

La dosis debe reducirse.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO

Exclusiva aplicación sobre dientes, muelas y encías.

Destapar el frasco y colocar el tubo aplicador en la válvula dosificadora. La aplicación podrá efectuarse, bien directamente pulsando medio segundo la válvula y orientando con el tubo aplicador la salida de la solución hacia la zona dolorida, o bien empapando un algodón con varias pulsaciones y manteniéndolo aplicado en la zona por unos momentos.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o ingestión accidental acuda a un centro médico o consulte al servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91/5620420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.



REACCIONES ADVERSAS

Puede aparecer sensación de quemazón bucal, o reacciones alérgicas en forma de erupciones en la piel. En estos casos suspenda la utilización del medicamento y acuda al médico. Si se observa ésta o cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

OTRAS PRESENTACIONES

HURRICAINÉ SPRAY: Envase con 5 ml

HURRICAINÉ GEL: Envase con 30 ml, 6 ml

TEXTO REVISADO

Marzo 2001

SIN RECETA MEDICA

"Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños"