

# dentispray

## benzocaína

**Alivio del dolor  
de muelas**

**Solución dental  
para toques**

Uso externo

### Composición

Benzocaína (DCI) .....	5,000 g
Mentol .....	0,200 g
Timol .....	0,225 g
Sacarina sódica .....	0,300 g
Alcohol etílico .....	65,850 g
Otros excipientes (menta piperita, polietilenglicol 400, fosfato disódico, agua) .....	c.s.p. 100 ml

Cada pulsación equivale aproximadamente a unos 3 mg de benzocaína.

### Propiedades

**dentispray** es una solución anestésica, envasada en un frasco con válvula dosificadora y cánula aplicadora, para el alivio sintomático de las molestias o dolores de muelas, dientes y encías.

La benzocaína, principio activo de **dentispray**, es un anestésico local ampliamente conocido, tanto por su eficacia como por su tolerancia. Su acción es tan rápida que produce alivio desde el primer minuto de aplicación.

El uso de **dentispray** no impide utilizar, además, analgésicos orales como el paracetamol o el ácido acetil-salicílico.

### Indicaciones

Alivio sintomático de los dolores de muelas, dientes y encías hasta poder ser atendidos adecuadamente por el odontólogo.

### Posología y normas para la correcta administración

Destapar el frasco y colocar el pulsador, con la cánula incorporada, sobre el tubo de salida de la válvula dosificadora. Presionar varias veces el pulsador hasta conseguir el llenado de la válvula. A continuación, la aplicación podrá efectuarse bien directamente pulsando la válvula y orientando con la cánula la salida de la solución hasta la zona dolorida, bien empapando un algodón con varias pulsaciones y manteniéndolo aplicado en la zona por unos momentos. En caso necesario, puede repetirse la operación 4 veces al día. Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda enjuagar la cánula con agua, secarla y guardarla.

### Contraindicaciones y precauciones

Hipersensibilidad conocida a la benzocaína u otros anestésicos locales derivados del ácido para-amino-benzoico (PABA).

No utilizar en niños menores de 2 años sin consultar al pediatra.

### **Interacciones**

Los inhibidores de la colinesterasa pueden inhibir el metabolismo de la benzocaína, razón por la que no se deberían utilizar conjuntamente.

La benzocaína, al igual que todos los anestésicos locales derivados del PABA, puede inhibir la actividad antibacteriana de las sulfonamidas.

### **Efectos secundarios**

La tolerancia de la benzocaína es muy buena. Las únicas reacciones adversas conocidas son las debidas a dosis excesivas, o bien hipersensibilidad o idiosincrasia del paciente.

### **Intoxicación y su tratamiento**

La baja solubilidad de la benzocaína hace que la absorción sea mínima, siendo muy difícil que se produzca una intoxicación involuntaria. En caso de producirse por sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

### **Presentación**

Frasco conteniendo 5 ml de solución dental para toques, con válvula dosificadora y cánula de aplicación.

### **Advertencia**

No es recomendable prolongar el tratamiento con **dentispray** más de 48 horas. En caso de persistencia del dolor tras ese tiempo, se consultará al odontólogo.

Inflamable. Mantener lejos del fuego o llamas. No fumar durante su aplicación.

### **Sin receta médica**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**



Director Técnico, A. Buxadé Viñas  
**Laboratorios Viñas sa**  
DIVISION FARMA  
Provenza, 386 - 08025 Barcelona